

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями | РП | Процент | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.2. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | РП | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией | РП | Процент | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 1.4. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов | РП | Процент | 41,9 | 42,6 | 43,3 | 43,9 | 44,6 | 45,3 | 46 | 46,7 | 47,4 | 48 | 48,7 | 49,4 |
| 1.5. | Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год | РП | Процент | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 |
| 1.6. | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (E10-E14) за отчетный год | РП | Процент | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |
| 1.7. | Охват граждан исследованием глюкозы натощак | РП | Процент | 50,2 | 51,3 | 52,4 | 53,4 | 54,5 | 55,6 | 56,7 | 57,8 | 58,9 | 59,9 | 61,1 | 62,1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|-------|--|--|----------------------------|------------------|-----|---|------|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|---|------|---|---|---|--------------|--|
| 1.1. | Реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом на территории Забайкальского края" | X | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта) | Региональный | <p>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении</p> <p>Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью</p> <p>Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями</p> <p>Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7% на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов</p> <p>Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией</p> <p>Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных дистансным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов</p> <p>Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год</p> <p>Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (E10-E14) за отчетный год</p> <p>Охват граждан исследованием глюкозы натощак</p> |
|------|---|---|---------|---|------|---|---|---|--------------|--|

